

İMAL TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

ŞARJ NUMARASI:

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 16.10.2019/11488

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
BAĞ	Bağ Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	400 ml/ 100 L su
DOMATES	Domates Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml/ 100 L su
HIYAR (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudopezonospore cubensis</i>)	400 ml/ 100 L su
MARUL (Sera)	Marul Mildiyösü (<i>Bremia lactucae</i>)	400 ml/ 100 L su
TURUNÇGİLLER	Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi çürüklük ve Gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	1000 ml/ 100 L su
PATATES	Patates Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml/ 100 L su
NAR	Narda Phytophthora Kök ve Kökboğazı çürüklüğü (<i>Phytophthora spp.</i>)	400 ml/ 100 L su
SOĞAN	Soğan Mildiyösü (<i>Peronospora Destructor</i>)	400 ml/da
MUZ	Muzda Fusarium Solgunluğu (<i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i>)	400 ml/ 100 L su
ÇİLEK (Sera-Tarla)	Çilekte Kök Çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Rhizoctonia spp.</i>)	400 ml/ 100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü, önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. **Damlama sulama için:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

agrikem

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

AGRI-FOS 400

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUP	U:33	SİSTEMİK FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	------	-------------------------------------

400 g/L Fosforoz Asit

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

GENEL ZEHİRLENME BELİ

RTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solumun: Temiz havaya çıkarın. Nefes almakta zorlanıyorsa oksijen verin. Nefes alamıyorsa derhal suni teneffüse başlayın.

Deri ile temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Ürün ile temas eden bölgeyi bol su ve sabun ile en az 15 dakika yıkayın. Eğer tahriş artar ve kalıcı olursa tıbbi yardım alın, tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göz ile temas: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım veya bakım alın.

Yutma: Bol miktarda su veya süt içirin. Kusturmayın. Tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



NET MİKTARI:

AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇİNDEKİLER:

Mono ve di-potassium phosphanate

Potasyum hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P234 Sadece orijinal kabında saklayın

P280 Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenler, yüz koruyucu kullanın

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanında bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Uygulama esnasında koruma uyarılarına mutlaka uyunuz.
- Uygulamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp el, yüz ve vücudunuzu bol su ile yıkayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Ambalajları/kapları çevreye, göl ve akarsulara, kanalizasyona atılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış, orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

AGRIKEM

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No:3 Bornova - İZMİR

Tel: 0232 374 42 00 Fax: 0232 374 49 26

Tic.Sic.No: Bornova-6169 • Hasan Tahsin V.D. 008 080 2030

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

28.08.2020 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

AGRI-FOS 400 kullanım zamanı önemlidir. AGRI-FOS 400 uygulaması için mildiyö'ye yönelik tahmin ve uyarı durumları dikkate alınmalı veya hastalık riskini artıran iklim koşulları oluşmaya başladığında uygulamaya geçilmelidir.

Bağ-mildiyö; ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates mildiyö; Çevredeki domates yapraklarında 3-5mm çapında, kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Hıyar(Sera)-Kabakgillerde mildiyö; Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Marul mildiyö; Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin şaşırtılmasına kadar uygulama sürdürülmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir. Uygulama, sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Turuncgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması: 1. İlaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır. 2. İlaçlama: Havalarda yağışlı giderse 1. İlaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı: Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.

Gövde ve kökboğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağacın 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilmelidir.

Patates-mildiyö; Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Narda Phytophthora Kök ve Kökboğazı çürüklüğü; Uygulama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk belirtiler görüldüğünde uygulamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir. Toprak üstü uygulamalarında ağacın tümü kaplanacak şekilde rüzgarsız havada uygulama yapılmalıdır.

Soğan Mildiyö; Günlük ortalama sıcaklığın 16°C ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekir de yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanmalıdır.

Muzda Fusarium Solgunluğu Uygulamaya muzun erken gelişim döneminde başlanır ve 10'ar gün aralıklarla 3 uygulama yapılır. Küçük alanlarda süzgeçli kova ile fidan diplerine ilaçlı su şeklinde uygulama da yapılabilir.

Çilekte Kök Çürüklüğü: Dikimden önce toprak uygulaması veya fidelerin ilaçlanması şeklinde yapılmalıdır. İlaçlamalar çilek fidelerinin toprak yüzeyine çıktığı zaman fide diplerine ilaçlı su uygulaması şeklinde yapılmalıdır. İlaçlama küçük alanlarda süzgeçli kova ile fide kök diplerine can suyu olarak yada büyük alanlarda damlama sulama ile yapılmalıdır.

agrikem

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

AGRI-FOS 400

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUP	U:33	SİSTEMİK FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	------	-------------------------------------

400 g/L Fosforoz Asit

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No:3 Bornova/İZMİR

Tel:+90 232 374 42 00 Fax:+90 232 374 49 26

FABRİKA ADRESİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 35. Cadde No:16
Döşemealtı/ANTALYA

AGRIKEM


Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No:3 Bornova - İZMİR

Tel: 0232 374 42 00 Fax: 0232 374 49 26

Tic.Sic.No: Bornova-6169 • Hasan Tahsin V.D. 008 080 2822

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili



28 Ağustos 2020
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AGRI-FOS 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AGRI-FOS 400'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

agrikem**AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ**
SAN. VE TİC. A.Ş.**AGRI-FOS 400**

Suda Çözünen Konsantre (SL)


GRUP	U:33	SİSTEMİK FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	------	-------------------------------------


400 g/L Fosforoz Asit

AGRIKEM

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No:3 Bornova - İZMİR
Tel: 0232 374 42 00 Fax: 0232 374 49 26
Tic.Sic.No: Bornova-6169 • Hasan Tahsin V.D. 008 080 2827


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. Yunus B. YRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.