

AGRI-FOS® 400

SİSTEMİK FUNGİSİT

GRUP

U:33

SİSTEMİK FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

Tam Sistemik Fungusit

%0

Bekletme Süresi

Resistanslık

Toksisite

Kalıntı

Risk



agrikem
Protector of your Plants

AGRI-FOS® 400

SİSTEMİK FUNGİSİT

ETKİN MADDE

"400 g/l Fosforoz Asidi",

Etki Mekanizması: Koruyucu ve tedavi edici etki.

Uyarılmış sistemik dayanıklılık mekanizmasını da aktive eder.

Bekletme Süresi

Resistanslık

Toksikite


Kalıntı

Risk


%0

Yaprak, gövde ve kökler gibi bitkinin tüm kısımlarına uygulanabilir.

AGRI-FOS 400, bitkinin bütün organlarında ksilem ve floem yoluyla kolayca absorbe edilebilmekte ve taşınabilmektedir.



- Kesinlikle kalıntı sorunu yoktur.
- Direkt ve dolaylı etki mekanizması ile dayanıklılık oluşturmaz.
- EPA tarafından "düşük riskli pestisif olarak sınıflandırılmıştır.
- Son ilaçlama ile hasat arası bekleme süresi "0" gündür Bitkinin doğal bağışıklık sistemini aktive eder Hedef dışı organizmalara zararsız, insan ve çevreye son derece güvenlidir.
- Entegre Mücadele (IPM) programlarına tam uyumludur



KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
BAĞ	Bağ Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	400 ml / 100 L su
DOMATES	Domates Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml / 100 L su
HIYAR	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	400 ml / 100 L su
MARUL (Sera)	Marul Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	400 ml / 100 L su
TURUNÇGİLLER	Turuncgil Meyvelerinde Kahverengi çürüklük ve Gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	1000 ml / 100 L su
PATATES	Patates Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 ml / 100 L su
NAR	Narda Phytophthora Kök ve Kökboğazı çürüklüğü (<i>Phytophthora spp.</i>)	400 ml / 100 L su
SOĞAN	Soğan Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	400 ml / da
MUZ	Muzda Fusarium Solgunluğu (<i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i>)	400 ml / 100 L su
ÇİLEK (Sera-Tarla)	Çilekte Kök Çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Rhizoctonia spp.</i>)	400 ml / 100 L su

AGRI-FOS 400 ile yapılan ilaçlama programları sonucunda; Özellikle ihraç edilen ürünler, biber, hıyar, taze / kututulmuş domates, işlenmiş domates ürünleri (salça, ketçap, küp domates vb.), patates, marul, narenciye, sofralık ve kum üzümde ilaç kalıntı riski bulunmamaktadır.